

implantat

Ispåsen du har fått med dig är för att kyla ner operationsområdet. Kylan håller ner svullnad och minskar blödningen.

Det är inte ovanligt att det sipprar lite blod från operationsområdet, det ser ofta mer ut än vad det är eftersom det är utblandat med saliv. Undvik fysisk ansträngning idag, eftersom det kan göra att blödningen tilltar. Om det fortsätter att blöda mycket: sitt upp och bit ihop på en kompress eller ren näsduk i ca 1 timme.

Undvik att skölja munnen med vatten på operationsdagen.
– Drick däremot gärna.

Du har fått med dig 4 st Ibumetin värktabletter.
Ta 1 tablett/gång vid behov, max 4 st/dygn.

Börja skölja med Paroex morgon och kväll dagen efter operationen, under ca 10 dagar. När det känns bra kan du börja borsta försiktigt med en mjuk tandborste.

Ät bara det som är lättuggat i en vecka efter operationen, t ex mosad mat, soppor, och liknande.

Efter operationen är det inte ovanligt om du blir svullen. Svullnaden kan tillta de första dagarna för att därefter sakta avta. Den följs ofta av blåmärken.

Är det något du undrar över eller oroar dig för så ring till oss på kliniken 0660-149 00, eller Anders mobil: 070-332 70 43, hem: 0660-377 030.

Ny tid hos oss för kontroll, borttagning av stygnen:

Goda råd efter implantatoperationen

